Devoir de Synthèse N° 2

**NB: Le sujet comporte cinq pages numérotées de 1/5 à 5/5 .
La page 5/5 à rendre avec la copie**

Exercice 1 : 5 Points

L'espace $\mathcal{E}$ est muni d'un repère orthonormé direct $(A; \vec{AB}; \vec{AD}; \vec{AE})$.

Dans la figure ci-contre :

- ☞ ABCDEFGH est un cube d'arrête 1 .
- ☞ Le point I est le centre de la face ABCD.
- ☞ Le point J est le milieu du segment [GH].

- 1
 - a Justifier que : $I(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$ et $J(\frac{1}{2}, 1, 1)$.
 - b En déduire que $\vec{DI} \wedge \vec{DJ} = -\frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{AD} - \frac{1}{2}\vec{AE})$.
 - c Calculer le volume V du tétraèdre EDIJ .
- 2
 - a Soit le plan $\mathcal{P} = (DIJ)$.
Montrer qu'une équation cartésienne du plan $\mathcal{P}$ est : $2x + 2y - z - 2 = 0$.
 - b Soit Δ la droite passant par E et perpendiculaire à $\mathcal{P}$ en un point K .
 - i. Vérifier que la droite Δ a pour représentation paramétrique :
$$\begin{cases} x = 2\alpha \\ y = 2\alpha \\ z = 1 - \alpha \end{cases} ; \alpha \in \mathbb{R}$$
 - ii. Déduire les coordonnées du point K.
 - iii. Soit $L(\frac{4}{3}, \frac{1}{3}, \frac{4}{3})$. Vérifier que K est le milieu du segment [DL] .

c Soit M un point variable de la droite Δ .

Montrer que le volume V_α du tétraèdre MDIJ est égal à $\frac{1}{8}|3\alpha - 1|$.

d Déterminer les coordonnées du point M pour que : $V_\alpha = 2V$.

3 Soit S l'ensemble des points $M(x, y, z)$ de l'espace E tels que : $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 4y + 3 = 0$.

a Montrer que S est une sphère de centre $\Omega(2, 2, 0)$ et de rayon $R = \sqrt{5}$.

b Vérifier que les points D et L appartiennent au sphère S.

En déduire que S et $\mathcal{P}$ sont sécants selon un cercle $\mathcal{C}$ dont on précisera le centre et le rayon.

4 Soit le point $N(2, -3, -4)$.

a Montrer que la droite (DN) est tangente à $\mathcal{C}$ dans le plan $\mathcal{P}$.

b Prouver que le volume V' du tétraèdre ΩKDN est égal à $\frac{DN \times DK \times K\Omega}{6}$.

c En déduire la valeur de V' .

Exercice 2 : 5 Points

Un commerçant spécialisé en photographie numérique propose en promotion un modèle d'appareil photo numérique et un modèle de carte mémoire compatible avec cet appareil.

Il a constaté, lors d'une précédente promotion, que :

* 20% des clients achètent l'appareil photo en promotion.

* 70% des clients qui achètent l'appareil photo en promotion, achètent la carte mémoire en promotion.

* 60% des clients n'achètent ni l'appareil photo en promotion ni la carte mémoire en promotion.

Un client entre dans le magasin.

On note A l'événement : " le client achète l'appareil photo en promotion ".

On note C l'événement : " le client achète la carte mémoire en promotion ".

1 a Donner les probabilités : $p(\bar{A})$ et $p(\bar{A} \cap \bar{C})$.

b Un client n'achète pas l'appareil photo en promotion. Calculer la probabilité qu'il n'achète pas la carte mémoire en promotion.

2 Dans la **figure 1** de l'annexe jointe compléter l'arbre pondéré décrivant la situation.

3 Montrer que la probabilité qu'un client achète la carte mémoire en promotion est 0,34.

4 Sachant qu'un client achète la carte mémoire en promotion. Calculer la probabilité que ce client achète aussi l'appareil photo en promotion.

5 Le commerçant fait un bénéfice de 30 DT sur chaque appareil photo en promotion et un bénéfice de 4 DT sur chaque carte mémoire en promotion.

On désigne par X la variable aléatoire égale au bénéfice du commerçant par client.

- a) Recopier et compléter le tableau suivant donnant la loi de probabilité de la variable aléatoire X .

Bénéfice par client en DT : x_i	0			
Probabilité d'atteindre le bénéfice : p_i	0.6			

- b) Déterminer l'espérance mathématique $E(X)$ de la variable aléatoire X .
- c) Pour 100 clients entrant dans ce magasin, quel bénéfice le commerçant peut-il espérer tirer de sa promotion.
- 6) Cinq clients entrent dans le magasin. On suppose que leurs comportements d'achat sont indépendants. Déterminer la probabilité qu'au moins un de ces cinq clients n'achètent pas la carte mémoire en promotion.

Exercice 3 : 4 Points

Soit f et g deux fonctions définies sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \ln^2(x)$ et $g(x) = \ln^3(x)$.

Leurs courbes représentatives respectives $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ sont représentées ci-contre dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

On considère la suite (J_n) définie sur $\mathbb{N}^*$ par $J_n = \int_1^e \ln^n(x) dx$.

- 1) a) Montrer que $J_1 = 1$.
 b) A l'aide d'une intégration par parties, montrer que $J_{n+1} + (n+1)J_n = e$.
 c) En déduire la valeur de J_2 et J_3 .
- 2) a) Déterminer les coordonnées des points d'intersection des deux courbes.
 b) Calculer l'aire $\mathcal{A}$ en unité d'aire de la partie du plan limitée par les deux courbes.
- 3) Calculer le volume $\mathcal{V}$ engendré par la rotation de l'arc $C = \{M(x, y) \text{ tel que } y = f(x) \text{ et } 1 \leq x \leq e\}$ autour de l'axe des abscisses.
- 4) a) Montrer que la suite (J_n) est à termes positifs et qu'elle est décroissante.
 b) Déduire de la question 1)b) que : $\frac{e}{n+2} \leq J_n \leq \frac{e}{n+1}$.
 c) Déterminer alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} nJ_n$.

Exercice 4 : 6 Points

Soit f la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par $f(x) = -x + \ln(1 + x^2)$.

On désigne par $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

- 1
 - a Montrer que f est dérivable sur $[0, +\infty[$ et que pour tout $x \in [0, +\infty[$ on a : $f'(x) = -\frac{(x-1)^2}{1+x^2}$
 - b Ecrire une équation de Δ de la demi-tangente à $\mathcal{C}_f$ à droite du point O .
- 2
 - a Vérifier que pour tout réel $x \in]0, +\infty[$ on a : $f(x) = -x + 2\ln(x) + \ln\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)$.
 - b Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et vérifier que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = -1$.
 - c Montrer alors que Δ est une direction asymptotique de $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$.
 - d Dresser le tableau de variation de f .
 - e En déduire que Pour tout réel $x \in [0, +\infty[$ on a : $\ln(1 + x^2) \leq x$.
- 3 Dans la **figure 2** de l'annexe ci-jointe on donne la courbe représentative Γ de la fonction g définie sur $[0, +\infty[$ par $g(x) = -x + \ln(1 + x)$.
 - a Vérifier que $A(1; -1 + \ln(2))$ est un point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$, puis en utilisant la courbe Γ placer le point A .
 - b Etudier la position relative de $\mathcal{C}_f$ et Γ .
 - c Construire Δ et $\mathcal{C}_f$.
- 4 On considère la suite (U_n) définie sur $\mathbb{N}$ par :
$$\begin{cases} U_0 = \frac{3}{2} \\ U_{n+1} = \frac{1}{2} \ln(1 + (U_n)^2) \end{cases}; \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}$$
 - a Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a : $U_n > 0$.
 - b Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a : $U_{n+1} \leq \frac{1}{2} U_n$.
 - c En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a : $U_n \leq \frac{3}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^n$.
 - d Déduire que la suite (U_n) est convergente et donner sa limite.
- 5 Soit la suite (S_n) définie sur $n \in \mathbb{N}$ par : $S_n = \sum_{k=0}^n U_k = U_0 + U_1 + U_2 + \dots + U_n$.
 - a Montrer que la suite (S_n) est strictement croissante.
 - b Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a : $S_n \leq 3 - \frac{3}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^n$.
 - c Déduire que la suite (S_n) est convergente.

Nom et prénom :

Épreuve : Mathématiques - Section : Sciences Expérimentales
◇ Session Mars 2024 ◇
Annexe à rendre avec la copie

Figure 1 (Exercice 2)

Figure 2 (Exercice 4)