Exercice 1 (6 points)

A) Le plan est orienté dans le sens direct, on considère le triangle direct OAB isocèle et rectangle en O, on désigne par I , J et H les milieux respectifs des segments $[OA]$, $[OB]$ et $[AB]$ et par C et K les symétriques respectifs des points B et I par rapport à O . (Voir feuille annexe)

1) Soit f la similitude directe qui envoie O sur A et A sur B .

a) Déterminer le rapport et l'angle de f .

b) Montrer que $f(I)=H$ et $f(B)=C$.

2) Soit Ω le centre de f .

a) Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de $f \circ f$.

b) Préciser $(f \circ f)(O)$ et $(f \circ f)(A)$, prouver que $(\widehat{\Omega O}, \widehat{\Omega B}) \equiv \frac{-\pi}{2}[2\pi]$ et

$(\widehat{\Omega A}, \widehat{\Omega C}) \equiv \frac{-\pi}{2}[2\pi]$ puis construire Ω .

3) Soit g la similitude indirecte qui envoie O sur A et A sur B .

a) Montrer que $g = f \circ S_{(OA)}$. En déduire $g(C)$.

b) Déterminer alors, les éléments caractéristiques de g .

B) On munit le plan du repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$ où $\vec{u} = \overrightarrow{OI}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{OJ}$.

1) a) Déterminer les écritures complexes de f et g .

b) Déterminer l'affixe de Ω et retrouver le centre de g par le calcul.

2) Soit l'équation $(E_\theta) : z^2 - (\cos\theta + 2i \sin\theta + 2i)z - 4 \sin\theta + 2i \cos\theta = 0 ; \theta \in [-\pi, \pi]$.

a) Vérifier que z_B (affixe de B) est une solution de l'équation (E_θ) .

b) En déduire l'autre solution de l'équation (E_θ) . (On la note z_M)

3) Soit M le point d'affixe $z_M = \cos\theta + 2i \sin\theta$.

a) Vérifier que pour tout $\theta \in [-\pi, \pi]$, M varie sur l'ellipse $(\mathcal{E})$ d'équation $4x^2 + y^2 = 4$.

b) Déterminer les foyers F et F' de $(\mathcal{E})$ et précises ses sommets. Construire $(\mathcal{E})$.

Exercice 2(4 points)

1) Soit, dans $\mathbb{Z}^2$, l'équation $(E) : 7x + 11y = 1$.

a) Vérifier que $(-3, 2)$ est une solution de l'équation (E) .

b) Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$, l'équation (E) .

c) En déduire la valeur de $u \in \{1, 2, \dots, 10\}$ telle que $7u \equiv 1 \pmod{11}$.

2) Soit les systèmes (S) : $\begin{cases} 7(x + 4) \equiv 2 \pmod{11} \\ 4(x + 4) \equiv 3 \pmod{7} \end{cases}$ et (S') : $\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{11} \\ x \equiv 2 \pmod{7} \end{cases}$.

a) Montrer que les systèmes (S) et (S') sont équivalents.

b) Montrer que x est une solution de (S) si et seulement si $x \equiv 23 \pmod{77}$.

c) Résoudre alors dans $\mathbb{Z}$, le système (S).

3) a) Vérifier que 2025 une solution de (S). En déduire les restes modulo 11 et 7 de 2025.

b) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a : $(2025)^n \equiv 1 \pmod{11}$ et $(2025)^{3n} \equiv 1 \pmod{7}$. En déduire que $(2025)^{3n} - 1$ est divisible par 77.

Exercice 3(3 points)

Le tableau ci-dessous donne, pour les années indiquées, le nombre de livres imprimés par une maison d'édition pendant une période fixe. On désigne par (X, Y) la série statistique double, où X est le rang de cette période et Y est le nombre de livres imprimés.

Année	2014	2016	2018	2020	2022	2024
X_i	1	2	3	4	5	6
Y_i	1000	1320	n	2500	4300	6500

1) Le nombre moyen de livres imprimés, entre les années 2014 et 2024, est 2875. Déterminer alors la valeur de n.

2) On prendra dans la suite $n=1630$.

Représenter le nuage des points de cette série statistique et placer le point moyen G. (**Sur la feuille annexe**)

3) On pose $Z = \ln\left(\frac{Y}{4}\right)$. (**dans la suite, arrondir les résultats au centième**)

a) Compléter le tableau de l'annexe.

b) Donner à 10^{-2} près par défaut, le coefficient de corrélation linéaire entre X et Z puis interpréter ce résultat.

c) Déterminer l'équation de la droite de régression D de Z en X.

d) Justifier qu'on peut modéliser le nombre de livres imprimés par $y = \alpha e^{\beta x}$ dont on précisera les valeurs de α et β .

e) Estimer, à l'aide de cet ajustement, le nombre de livres imprimés 2028.

Exercice 4(7 points)

Soit n un entier naturel non nul ($n \in \mathbb{N}^*$) et f_n la fonction définie par :

$f_n(x) = n \ln\left(\frac{\sqrt{x^2+n^2}+x}{n}\right)$ et (C_n) sa courbe dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

- 1) a) Justifier que f_n est définie sur $\mathbb{R}$ puis montrer qu'elle est impaire.
 b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x)$ et montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f_n(x)}{x} = 0$ puis interpréter graphiquement ces résultats.
 c) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$; $f_n'(x) = \frac{n}{\sqrt{x^2+n^2}}$ puis dresser le tableau de variation de f_n .
- 2) a) Former une équation de la tangente (T) à (C_n) en O.
 b) Etudier le sens de variation de la fonction h_n définie sur $\mathbb{R}$ par :
 $h_n(x) = f_n(x) - x$, calculer $h_n(0)$ puis donner le signe de $h_n(x)$ sur $\mathbb{R}$.
 c) En déduire la position de la courbe (C_n) par rapport à (T). Interpréter.
- 3) Soit la fonction φ_n définie sur $\mathbb{R}$ par : $\varphi_n(x) = f_{n+1}(x) - f_n(x)$.
 a) Montrer que $\varphi_n'(x) = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{x}{n+1}\right)^2+1}} - \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{x}{n}\right)^2+1}}$ puis déduire que φ_n est strictement croissante sur $\mathbb{R}$. Calculer $\varphi_n(0)$ puis donner le signe de $\varphi_n(x)$ sur $\mathbb{R}$.
 b) En déduire la position relative des courbes (C_n) et (C_{n+1}) .
- 4) a) Montrer que f_n admet une fonction réciproque g_n définie sur $\mathbb{R}$.
 (On note (C'_n) sa courbe représentative dans le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$).
 b) Exprimer $g_n(x)$ en fonction de x pour tout $x \in \mathbb{R}$ puis vérifier que G_n est une primitive de g_n sur $\mathbb{R}$ où $G_n(x) = \frac{n^2}{2} (e^{\frac{x}{n}} + e^{-\frac{x}{n}})$.
- 5) a) Tracer (C_1) et (C'_1) courbes respectives des fonctions f_1 et g_1 .
 b) Calculer l'aire $\mathcal{A}$ de la partie du plan limitée par la courbe (C_1) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x=0$ et $x=1$.
- 6) Soit F la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = \int_0^{g_1(x)} f_1(t) dt$.
 a) Montrer que F est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que $F'(x) = \frac{x}{2} (e^x + e^{-x})$.
 b) Calculer $F(0)$ puis établir que pour tout $x \in \mathbb{R}$; $F(x) = 1 + \frac{1}{2} [(x-1)e^x - (x+1)e^{-x}]$.
 c) Retrouver alors, l'aire $\mathcal{A}$.
- 7) Soit $n \in \mathbb{N}^*$; $S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f_1\left(\frac{k}{n}\right)$ et $\mu = \int_0^1 f_1(x) dx$. ($D = \{1, 2, \dots, n\}$)
 a) Montrer que pour tout $k \in D$; on a : $\frac{1}{n} f_1\left(\frac{k-1}{n}\right) \leq \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f_1(x) dx \leq \frac{1}{n} f_1\left(\frac{k}{n}\right)$
 b) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a : $\mu \leq S_n \leq \mu + \frac{1}{n} f_1(1)$.
 c) Calculer alors, $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.

Feuille annexe à rendre

Exercice 1

Exercice 3 (2)

Exercice 3 (3-a)

X_i	1	2	3	4	5	6
Z_i						

Exercice 4 (5-a)