Exercice 1 : (4 points)

Soit $\theta \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$.

On désigne par M_1 et M_2 les points d'affixes respectives $z_1 = -\cos(\theta) e^{i\theta}$ et $z_2 = i \sin(\theta) e^{i\theta}$.

1. a) Justifier que les points O, M_1 et M_2 ne sont pas alignés .

b) Vérifier que $OM_1^2 + OM_2^2 = M_1M_2^2$.

c) En déduire que les points M_1 et M_2 appartiennent à un même cercle (Γ) dont on déterminera le rayon et l'affixe z_I du centre I .

Construire le cercle (Γ) sur l'annexe fourni.

2. Déterminer , en fonction de θ un argument de z_1 puis en déduire une construction du point M_1 puis de

M_2 pour $\theta = \frac{\pi}{6}$.

3. Déterminer la valeur θ_0 de θ pour laquelle l'aire $\mathcal{A}$ du triangle OM_1M_2 est maximale .

4. a) Déterminer l'affixe du point A pour que le quadrilatère OM_1AM_2 soit un rectangle .

b) Déterminer la valeur de θ pour laquelle OM_1AM_2 est un carré .

Exercice 2 : (5 points)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{1-x} - 1}{x} & \text{si } x \in]-\infty, 0[\\ \frac{\sqrt{x}}{x-1} \sin\left(\frac{\pi}{x}\right) & \text{si } x \in]0, 1[\cup]1, +\infty[\end{cases}$$

1. Etudier la limite de f en 0 .

2. Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

3. Montrer que f est prolongeable par continuité en 1 .

4. Montrer que f est continue sur $]1, +\infty[$.

5. a) Montrer que f est strictement décroissante sur $] -\infty, 0[$.

b) En déduire $f(] -\infty, 0[)$.

6. Soit g la fonction définie sur $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ par $g(x) = f\left(\frac{1}{\cos(x)}\right)$.

a) Déterminer la limite de g à gauche en $\frac{\pi}{2}$.

b) Montrer que g est continue sur $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$.

Exercice 3 : (6 points)

Dans le plan rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on considère ci-dessous la courbe (C_f) : représentation graphique d'une fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$ et dérivable sur $] -\infty, -2[$ et sur $] -2, +\infty[$.

On donne :

- Les droites $\Delta_1 : y = -2$,
 $\Delta_2 : x = -2$ et $\Delta_3 : y = x - 4$ sont des asymptotes à (C_f)
- Les points $A(0, -2)$, $B(2, -1)$,
 $C(-1, -1)$ et $D(-3, -3)$ sont des points de (C_f) .
- $\Delta_1 : y = -2$ est la tangente à (C_f) en A

1. Déterminer : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x + 4)$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{f(x)}{f(x) + 2} \right)$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{x}{f(x) + 2} \right)$.
2. Déterminer l'ensemble de définition de la fonction $f \circ f$.
3. On désigne par h la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par :
$$h(x) = \begin{cases} f \circ f(x) & \text{si } x \in \mathbb{R} \setminus \{-2, 0\} \\ -2 & \text{si } x = -2 \end{cases}$$
 - a) Déterminer : $\lim_{x \rightarrow 0} h(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)$.
 - b) Etudier la continuité de h à droite et à gauche en (-2) .
 - c) On désigne par α la solution négative de l'équation $f(x) = 0$. Déterminer $f(] -2, \alpha])$.
 - d) Montrer que h est strictement décroissante sur $] -2, \alpha]$.
4. a) Montrer que h est continue sur $]0, 2[$ et déterminer $h(]0, 2[)$.
 b) Montrer que la fonction : $\varphi : x \mapsto h(x) - f(x)$ garde un signe constant sur $]0, 2[$

Exercice 4 : (5 points)

Le plan est rapporté à un repère orthonormé directe $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

On considère les points A et B d'affixes respectives i et $\frac{1+i}{2}$.

A tout point $M(z)$ on associe le point $M'(z')$ tels que $z' = (1 - i)z - 1$.

1. Déterminer l'ensemble (E) des points $M(z)$ tel que $|z'| = 2\sqrt{2}$. Construire l'ensemble (E) sur l'annexe fournie
2. On suppose que $M \neq B$.

a) Montrer que $\arg(z') \equiv -\frac{\pi}{4} + \widehat{(\vec{u}, \vec{BM})} [2\pi]$.

- b) En déduire l'ensemble (F) des points $M(z)$ tels que z' soit un réel strictement négatif.
- c) Construire l'ensemble (F) sur le même repère.

3. On suppose que $M \neq A$.

- a) Montrer que le triangle AMM' est rectangle et isocèle en M.
- b) Les ensembles (E) et (F) se coupent en un point C. Construire le point C' associé au point C.

Nom et prénom :

Exercice 2

Exercice 4 :